

Jitter-tutkimus ja siihen valmistautuminen

Jitter on EMG- (lihassähkö tutkimuksen) erikoistutkimus, jolla selvitetään yhden lihassyyn sähköistä toimintaa ohuella neulaelektrodilla.

Tutkimus kestää noin 1 – 1 ½ tuntia.

Ennen tutkimusta

Jos sinulla on Mestinin-lääkitys, selvitä hoitavalta lääkäriltäsi, onko sinun tarkoitus pitää lääketauko ennen tutkimusta.

Saat syödä ja juoda normaalisti.

Tutkimuksen aikana

Tutkimuksessa olet makuuasennossa vuoteella. Lääkäri mittaa ohuella neulaelektrodilla yksittäisen lihassyyn sähköistä toimintaa.

Tutkimuksella ei yleensä ole jälkivaikutuksia, mutta ohimenevä pistokohdan verenpurkauma, paikallinen kipu, pieni kudonvaurio tai erittäin harvoin tulehdus on mahdollinen. Joskus harvoin kroonisesta kivusta kärsivillä potilailla tavanomainen kipuoire saattaa tilapäisesti korostua tutkimuksen jälkeen noin yhden päivän ajan.

Tutkimuksen jälkeen

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.



Potilasohje

2 (2)

HUS Kuvantaminen

Kliininen neurofysiologia (KNF)

www.tutkimukseen.fi

Voimaantulopäivä: 1.3.2021

Kieliversiot: Jitter-tutkimus ja siihen valmistautuminen, JITTER-undersökning och förberedelser inför undersökningen, JITTER examination and how to prepare for it

Tunniste: 2969