

Helikobakteeriantigeenin osoitus ulosteesta

Tietyt lääkeaineet saattavat vaikuttaa testin tulokseen. Siksi on suotavaa olla kahden viikon ajan käyttämättä vismuttivalmisteita (mm. Tannocon, Pylorid ja De-Nol) tai protonipumpun inhibiittoreita (mm. Lanzo®, Losec®, Nexium®, Omeprazol, Pariet®, Somac®, Zolt®). Antibioottihoidosta tulee olla kulunut vähintään neljä viikkoa. Ohjeita noudattamalla varmistat mahdollisimman luotettavien tulosten saannin. Jos olet poikennut ohjeista, ilmoitta siitä näytteen vastaanottajalle.

Näytteenottotarvikkeet

Terveysaseman/sairaalan henkilökunta antaa sinulle näytteenottoa varten kaarimaljan tai vastaavan astian (esim. kertakäyttölautasen), näytepurkin, suljettavan muovipussin ja nimitarrat.

Ulostenäytteen ottaminen

Ota ulostetta kaarimaljaan tai vastaavaan astiaan, esim. kertakäyttölautaselle. Ota reilu peukalonpään kokoinen nokare tuoretta ulostetta näytepurkkiin kanteen kiinnitetyllä lusikalla. Sulje kansi huolellisesti. Näytteen tunnistamiseksi on tärkeää, että kiinnität näytepurkkiin tarran, johon olet merkinnyt nimesi, henkilötunnuksesi, näytteen ottopäivän ja kellonajan. Sulje näytepurkki muovipussiin. Toimita näytepurkki laboratorioon samana päivänä tai viimeistään seuraavana aamuna. Näyte on säilytettävä viileässä, esim. jääkaapissa.

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa asiakaspalveluun (p. 09 471 86800) ma-pe klo 7.00–15.30. Laboratoriovastauksia ei anneta puhelimitse.