

PÅVISANDE AV HELIKOBAKTERIEANTIGEN I AVFÖRINGEN

En del mediciner kan påverka testresultatet. Därför rekommenderas att under två veckors tid avstå från att använda vismutpreparat (bl.a. Tannocon, Pylorid ja De-Nol) eller protonpumpshämmare (bl.a. Lanzo[®], Losec[®], Nexium[®], Omeprazol, Pariet[®], Somac[®], Zolt[®]). Det bör ha förflutit minst fyra veckor från en antibiotikabehandling.

Genom att följa anvisningarna säkerställer du att resultaten blir så tillförlitliga som möjligt. Meddela den som tar emot provet ifall du har avvikit från anvisningarna.

Provtagningsmaterial

Personalen på hälsostationen/sjukhuset förser dig med en rondskål eller motsvarande kärl (t.ex. en engångstallrik), en provtagningsburk, en förslutningsbar plastpåse samt etiketter för provtagningen.

Avföringsprovtagning

Samla avföring i en rondskål eller ett motsvarande kärl, till exempel en engångstallrik.

Ta en klick med färsk avföring, något större än en tumspets, med hjälp av skeden som är fäst vid provtagningsburkens lock och placera den i provtagningsburken. Skruva på locket omsorgsfullt.

För att provet ska kunna identifieras är det viktigt att du klistrar en etikett med ditt namn, personbeteckning och datum för provtagningen på provtagningsburken. Lägg provtagningsburken i plastpåsen och förslut påsen.

Lämna in burken till laboratoriet samma dag eller senast nästa morgon. Provet ska förvaras svalt, till exempel i kylskåp.

Om du har några frågor kan du ringa till HUSLABs servicetelefon 09 471 86800 må - fre kl. 7.30-15.30 OBS! laboratorieresultat ges inte per telefon.