

ULOSTEEN HELIKOBAKTEERINÄYTE (-HepyNhO)

Saat näytteenottotarvikkeet HUSLABin toimipisteestä

Vetinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi.

Tiettyjä lääkkeitä ei voi käyttää ennen näytteenottoa. Katso kohta lääkerajoitteet.



Huom!
Säilytä näyteputkea lasten ulottumattomissa.
Sisältää guanidiinitiosyanaattia.

Katso kohta toimintaohje.

Ulostenäytteen ottaminen

- 1) Ota ulostenäyte esim. kertakäyttölautaselle.
- 2) Avaa näyteputken vaaleansininen korkki ja aseta putki pystyasentoon tasaiselle alustalle.
- 3) Ota näytteenottotikku pois suojapakkauksesta.
- 4) Työnnä näytteenottotikun pää ulosteeseen. Älä laita ulostetta tikkuun liikaa, vain ohut kerros tikun päähän.



Sopivasti näytettä

Liian vähän näytettä

Liikaa näytettä

- 5) Työnnä näytteenottotikku näyteputken nesteeseen ja sekoita hyvin.
- 6) Ota näytteenottotikku pois nesteestä ja hävitä se esim. sekajätteen mukana.
- 7) Sulje näyteputki huolellisesti putken omalla, sinisellä korkilla.
- 8) Kirjoita tarraan nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottopäivämäärä ja aika.
- 9) Laita sinikorkkinen näyteputki ja tarra muovipussiin. Sulje pussi huolellisesti.
- 10) Tuo näyteputki mielellään samana päivänä laboratorioon. Jos et voi tuoda näytettä samana päivänä, säilytä näyte jääkaapissa seuraavaan päivään asti.

Lääkerajoitteet

Lääkeitä, joita ei voi ottaa kahteen viikkoon ennen näytteen ottamista:

- **Protonipumpun estäjät: esim.** Losec®, Omeprazol®, Meprazol®, Omestad®, Pantopratsoli®, Pantoprazol®, Pantoprazole®, Somac®, Gasterix®, Lanrec®, Lansoprazol®, Lansoprozole®, Lantil®, Lanvone®, Lanzo melt®, Zolt®, Pariet®, Rabeprazol®, Acidial®, Esomeprazol®, Nexium®

Lääkkeitä, joita ei voi ottaa neljään viikkoon ennen näytteen ottamista:

- **Helikobakteerin häätöhoidot: esim.** Helipak A®, Helipak K
- **Antibiootit**

Toimintaohje näyteputken nesteen joutuessa

Iholle:

- Riisu saastunut vaatetus.
- Pese iho runsaalla vedellä ja miedolla pesuliuksella noin 10 -15 min ajan.

Silmiin:

- Huuhtele runsaalla vedellä noin 20 – 30 min ajan.
- Jos silmiin kehittyä tulehdusoireita, kuten kipua tai näköhäiriöitä ota yhteys lääkäriin.

Suuhun:

- Älä yritä oksentaa.
- Huuhtele suu.
- Juo vettä (n. 1 lasillinen).

Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen p. 09 471 977 tai 09 4711.

Lisätiedustelut

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa HUSLABin palvelunumeroon p. 09 471 86800 ma - pe klo 7.30-15.30. Palvelunumerosta ei valitettavasti voida antaa laboratoriovastauksia.