

## عينة الطفيليات بالبراز Ulosteen parasiittinäyte

يمكنكم أن تحصلوا على لوازم أخذ العينة من أقرب مختبر هوسلاب (HUS) طاس مقوس أو ما يشابهه (كصحن للاستعمال مرة واحدة مثلاً).  
3-1 أو عية عينات فيها مادة الفورمالين (تحذير: مادة سامة، أنظر التعليمات).  
أكياس بلاستيكية قابلة للغلق ولاصقات كتابة الاسم.

### أخذ عينة البراز

1. خذوا كل عينة في أيام مختلفة أو على الأقل في عدة مرات تبرز مختلفة.
2. خذوا العينة في الطاس المقوس أو ما يشابهه كصحن للاستعمال مرة واحدة مثلاً.
3. خذوا بواسطة الملاعة المثبتة على غطاء وعاء العينة قطعة بقدر رأس الخنصر بحيث يتم جمع العينة من جزء البراز الأكثر مخاطية وتلوثاً بالدم أو من الأجزاء الأجزاء الشاذة من البراز.
4. اخلطوا البراز بالفورمالين الموجود في الوعاء بحيث يصبح كتلة متجانسة كقوام العصيدة، وانتبهوا إلى أن مرحلة خلط العينة للتجانس هي مرحلة مهمة. فإذا كان البراز سائلاً فخذوا منه ما يعادل ثلث كمية الفورمالين. اغلقوا السدادة بإحكام.
5. الصقوا اللاصقة على جدار الوعاء بعد أن تكونوا قد كتبت عليها اسمكم ورقم الضمان الاجتماعي أي رقم كيلا ووقت أخذ العينة.
6. ضعوا وعاء العينة في الكيس البلاستيكي بعناية واغلقوا الكيس بإحكام.
7. خذوا كل العينات مرة واحدة إلى المختبر بالسرعة الممكنة بعد آخر مرة من مرات أخذ العينة (خلال أسبوع واحد).

### استعلامات إضافية

إذا كان عندكم أية استفسارات فيمكنكم الاتصال برقم الخدمات لدى مختبر هوسلاب (HUS) 09 471 86800 أيام الاثنين - الجمعة الساعة 7.30-15.30، علماً أن رقم الخدمات هذا لا يعطي للأسف أجوبة عن نتائج الاختبار.

### تعليمات احتياطا للتعرض للفورمالين

#### الجلد:

- اخلعوا الملابس الملوثة
- اغسلوا الجلد بكثير من الماء ومحلول الصابون الخفيف لحوالي 10 - 15 دقيقة

#### العينين:

- اشطفوا العينين بكثير من الماء لحوالي 20 - 30 دقيقة
- إذا ظهرت على العينين أعراض التهاب كالآلم أو اضطراب الرؤية، فاتصلوا بالطبيب

#### الفم:

- لا تحاولوا التقيؤ
- اشطفوا الفم بالماء
- اشربوا ماءً (حوالي كأس واحد)
- اتصلوا عند الضرورة بمركز استعلامات التسمم هاتف 09 471 977 أو 09 4711