

Näytteenotto virtsasta klamydia- ja tippuritutkimusta varten

Oikea valmistautuminen on tärkeää!

Sinun tulee olla virtsaamatta ja ilman alapesua vähintään 2 tuntia ennen kuin annat näytteen. Näyte otetaan heti virtsasuihkun alusta (ensimmäisestä pisarasta lähtien).

Virtsanäytteenottoastian saat lähimmästä HUSLABin toimipisteestä

Virtsanäytteenottoastia on kannellinen näytepurkki (120 ml), johon näytteenottaja merkitsee viivan, mitä enempää purkkiin ei saa laskea virtsaa.

Virtsanäytteenotto

- 1) Älä tee alapesua
- 2) Laske virtsaa ensipisarasta lähtien keräysastiaan korkeintaan näytteenottajan tekemän merkkiviivan saakka (20-30 ml). Lopun virtsan voit laskea WC-pyttyyn.

Näytteenoton päätyttyä

Kiinnitä virtsanäytteenottoastiaan tarra, johon olet merkinnyt nimesi ja henkilötunnuksesi ja ajan, milloin otit virtsanäytteen. Laboratorio ei tutki puutteellisesti merkittyjä näytteitä.

Toimita näytteenottoastia vuorokauden sisällä laboratorioon, säilytä huoneenlämmössä. Jos olet joutunut poikkeamaan ohjeista, kerro siitä näytteen vastaanottajalle.

Jos sinulla on kysyttävää näytteenoton suhteen, voit soittaa asiakaspalveluun, puh. 09 471 86800 ma-pe klo 7.30–15.30. Palvelunumerosta ei valitettavasti voida antaa laboratoriovastauksia. Vastauksen saat sinua hoitavalta taholta.