

Mahalaukun biomerkkiainetutkimus

Sinulle on suunniteltu tehtäväksi mahalaukun biomerkkiainetutkimus (ns. GastroPanel) verinäytteenä. Näitä ohjeita noudattamalla varmistatte mahdollisimman luotettavien tulosten saannin.

Ennen tutkimusta

Jos sinulle on määrätty laaja tutkimuspaketti (fP -Mabi-La), sinun tulisi olla 4–10 tuntia syömättä, juomatta ja tupakoimatta.

Jos sinulle on määrätty suppea tutkimuspaketti (fP -Mabi-Su), paasto ei ole tarpeen.

Mahanesteiden eritykseen vaikuttava lääkitys keskeytetään oman hoitavan lääkärin luvalla ohessa olevan aikataulun mukaan. Mikäli lääkitystä ei voida keskeyttää, sinun tulisi ilmoittaa näytteenottajalle käyttämäsi lääkkeet. Tutkimus ei edellytä muiden lääkkeiden ottamisen keskeyttämistä.

Viikko ennen näytteenottoa seuraavia suolahapon eritystä estäviä lääkkeitä ei tule käyttää:

- ranitidiini (Esofex, Inside Brus, Ranicur, Ranil, Ranimex, Ranitidin, Ranitidine, Ranixal, Zantac)
- famotidiini (Famotidin, Pepcid, Pepcidin, Pepcid Duo)
- nitsadiini (Nizax)
- protonipumpun estäjät: lansopratsoli, omepratsoli, pantopratsoli, esomepratsoli, rabepratsoli ym. (Lansoprazol, Lansoprazole, Lanzo, Zolt, Losec, Omeprazol, Nexium, Pariet, Somac, Gasterix, Pantoloc, Giasemin, Panzor)

Vuorokausi ennen näytteenottoa seuraavia mahanesteitä neutraloivia lääkkeitä ei tule ottaa:

- antasidit (Balacid Novum, Gaviscon, Link, Magnesiummaito, Novaluzid, Rennie)
- limakalvon suoja-aineet (Alsucral, Antepsin)

Jos olet poikennut ohjeista, ilmoita siitä näytteenottajalle.

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa asiakaspalveluun: p. 09 471 86800 (ma–pe klo 7.30–15.30)