

Undersökning av magsäcken med GastroPanel

Du har ordinerats undersökning av magsäcken med ett s.k. GastroPanel-prov som görs med hjälp av blodprov. Genom att följa nedanstående anvisningar säkerställer du, att resultaten blir så tillförlitliga som möjligt.

Före undersökningen

Om du har ordinerats ett omfattande prov (fP-Mabi-La), skall du inte äta, dricka eller röka i 4–10 timmar före provtagningen. Om provet som skall tas är begränsat (fP-Mabi-Su), är det inte nödvändigt att fasta.

Din egen behandlande läkare ger tillstånd att avbryta läkemedelsbehandling som reglerar utsöndringen av magsafter enligt vidstående tidtabell. Om det inte är möjligt att avbryta läkemedelsbehandlingen, skall du meddela provtagaren vilka läkemedel du använder. Det är inte nödvändigt att avbryta behandlingen av några andra läkemedel på grund av undersökningen.

En vecka före provtagningen skall du inte använda följande läkemedel som förhindrar utsöndring av saltsyra:

- ranitidin (Esofex, Inside Brus, Ranicur, Ranil, Ranimex, Ranitidin, Ranitidine, Ranixal, Zantac)
- famotidin (Famotidin, Pepcid, Pepcidin, Pepcid Duo)
- nizadin (Nizax)
- protonpumpshämmare: lanzoprazol, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol m.fl. (Lansoprazol, Lansoprazole, Lanzo, Zolt, Losec, Omeprazol, Nexium, Pariet, Somac, Gasterix, Pantoloc, Giasemin, Panzor)

Ett dygn före provtagningen skall du inte ta följande läkemedel som neutraliserar magsafterna:

- antacida (Balacid Novum, Gaviscon, Link, Magnesiummjölk, Novaluzid, Rennie)
- skyddsmedel för slemhinnan (Alsucral, Antepsin)

Meddela provtagaren om du har avvikit från anvisningarna.

Om du har frågor, kan du ringa till kundtjänst: tfn. 09 471 86800 må–fr kl. 7.30–15.30 (laboratorieresultat lämnas inte ut per telefon).