

Mycoplasma genitalium, nukleiinihappo (kval) (-MygeNhO KL 6195); uusi tutkimus otetaan käyttöön 15.7.2013

Tutkimus	6195	-MygeNhO	-Mycoplasma genitalium, nukleiinihappo (kval)
Asia	Uusi tutkimus		
Johdanto	<i>Mycoplasma genitaliumin</i> aiheuttaman infektiön kliininen kuva vaihtelee oireetomasta kantajuudesta hankalaan uretriittiin ja servisiittiin. <i>M. genitalium</i> – infektiön hoitokäytäntö on esitetty sukupuolitautilien Käypä Hoito -suosituksessa vuodelta 2010.		
Indikaatiot	Epäselvä miesten ja naisten uretriitti ja naisten servisiitti.		
Näyte	Limakalvonäyte dacron-tikulla. Näytetikku katkaistaan joko viruskuljetusputkeen tai kierrekorkilliseen putkeen, jossa on 0.5-1.0 ml steriiliä keittosuolaa. Virtsanäyte ei sovellu testiin.		
Lähete ja näytteen lähettäminen	Virustutkimuslähete. Näytteet toimitetaan lähetteen kanssa HUSLABin kliinisen mikrobiologian näytteiden vastaanottoon osoitteella: HUSLAB, Kliininen mikrobiologia, Näytteiden vastaanotto, PL 400, 00029 HUS.		
Menetelmä	Reaaliaikainen polymeerasiketjureaktio (reaaliaikainen PCR). Alihankintana teettävä tutkimus.		
Tekstiheys	Tarvittaessa.		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian osasto, virologian yksikkö, p. (09) 191 26555.		
Allekirjoitukset	Maija Lappalainen Dosentti, osastonylilääkäri Vastuuyksikön päällikkö puh. (09) 191 26772	Martti Vaara Professori, ylilääkäri Vastuualuejohtaja puh. (09) 471 75822	