

Plasman kopeptiinin (6356 P -Kopept) ja vasoaktiivisen intestinaalisen peptidin (2932 fP-VIP) tekopaikka muuttuu 1.6.2017 alkaen, mikä aiheuttaa pieniä muutoksia ko. tutkimusten ohjekirjatietoihin

Tutkimukset 6356 P -Kopept P -Kopeptiini
2932 fP-VIP fP-Vasoaktiivinen intestinaalinen peptidi

Asia Tekopaikka-, viitearvo- (P -Kopept), tulostaso (fP-VIP) - ja tekotiheysmuutos

Johdanto Alihankintalaboratoriomme Yhtyneet Medix Laboratoriot siirtää kopeptiinin (6356 P -Kopept) ja vasoaktiivisen intestinaalisen peptidin (2932 fP-VIP) määrittämisen alihankintalaboratorioon. Tekopaikkamuutos nopeuttaa kummankin tutkimuksen vastausten valmistumista.

1.6.2017 tapahtuvan muutoksen myötä *kopeptiinin* viitearvoissa tapahtuu pieni muutos (ks.yst alla).

Vasoaktiivisen intestinaalisen peptidin määritysmenetelmä tai viitearvot eivät muutu. Yli 30 pmol/l pitoisuuksilla voi olla tulostasoeroja nykyiseen menetelmään verrattuna, mikä on huomioitava seurannassa olevilla potilailla. Plasmanäytettä ei tarvitse enää jakaa kahteen putkeen. Nämä muutokset tulevat voimaan 6.6.2017 alkaen.

Viitearvot

P -Kopept, pmol/l	S -Osmol, mosm/kg H ₂ O Samaan aikaan otettava näyte.
0.81-11.6 Alaraja otetaan käyttöön.	270-280
1.0-13.7	281-285
1.5-15.3	286-290
2.3-24.5	291-295
2.4-28.2	296-300

fP-VIP: Viitearvoissa ei muutoksia

Tekotiheys

P -Kopept: Kolme kertaa viikossa.
fP-VIP: Kerran viikossa.

Tulokset valmiina	P -Koept: Viikon kuluessa. fP-VIP: 1-2 viikon kuluessa.	
Tiedustelut	Helene Markkanen, erikoislääkäri, puh. 050 427 1612	
Allekirjoitukset	Helene Markkanen erikoislääkäri HUSLAB Erikoiskemia puh. 050 427 1612	Lotta Joutsi-Korhonen vs. ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2402